

ST 599 IPRO

BT93759IPRO

· Ciclo preferencial para a região, com resistência a fitóftora, estabilidade produtiva e tolerância ao acamamento.

· Excelente arranque inicial, o que ajuda a lavoura a se estabelecer mais rapidamente.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

Grupo de maturação	5.9
Hábito de crescimento	Indeterminado
Cor da pubescência	Cinza
Cor da flor	Roxa
Cor do hilo	Preto imperfeito
Exigência em fertilidade	Média / Alta
Peso médio de 1000 grãos	170 gramas
Trait	Intacta RR2 PRO

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR	S
Podridão R. de Fitóftora (Campo)	●	○	○
Cancro da Haste	●	○	○
Pústula Bacteriana	●	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○	●



ST 599 IPRO MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas / ha) nas regiões recomendadas

REC	REGIÃO		OUT		NOV		DEZ		
			11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
101	Coxilha	1	300	280	280	280	300		
102	RS / SC (Abaixo 400 mts)	2	300	280	280	280	300		
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650 mts)	3	280	260	260	260	280		
104	Litoral SC	4		280	260	260	260	280	320

■ Tolerado
■ Recomendado